

พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ

จังหวัดพิจิตร ผลัดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548

Behavioral Surveillance System Among Male Conscripts, Phichit May 2005

ณัฐวรรณ จันทนากร *

จิตภา อยู่มพันธ์**

วิไลวรรณ ยาประสิทธิ์***

บทคัดย่อ

การศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ของทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร ผลัดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการควบคุม และป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนของจังหวัดพิจิตร ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ เอชไอวี ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ใช้โปรแกรม Epi Info, version 6.04 d ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา พบว่าชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร ผลัดที่ 1 ปี 2547 - 2548 มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ปี พ.ศ.2547 อายุเฉลี่ย 20.4 พ.ศ. 2548 อายุเฉลี่ย 23.1 อายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลง มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 8 ปี (1 คน จากทหาร 453 คน) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 36.3 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 31.6 และสถานภาพโสด ร้อยละ 77.0 ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นปี 2547 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 72.7 ปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78.0 คู่่อนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกเป็นคนรักหรือเพื่อนสนิท มากที่สุดร้อยละ 64.8 การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใช้น้อยลงปี พ.ศ.

* นักวิชาการสาธารณสุข 7 งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

** นักวิชาการสาธารณสุข 7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

*** นักวิชาการสาธารณสุข 6 งานพัฒนากุลตากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

2547 ใช้ร้อยละ 48.3 ปี พ.ศ. 2548 ลดลงเหลือร้อยละ 46.8 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์รอบปีที่ผ่านมา ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ลดลงเกือบทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มหญิงอื่น และยังคงใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากที่สุดในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ เท่ากับร้อยละ 64.0 ด้านการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นกามโรคพบว่ามีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องมากขึ้น ส่วนประสบการณ์การใช้สารเสพติดพบว่ามีประสบการณ์การเคยใช้ลดลง สารเสพติดที่เคยใช้ส่วนใหญ่คือบุหรี่เช่นเดียวทั้งสองปี ส่วนการใช้สารเสพติดรอบปีที่ผ่านมาพบว่าเคยใช้ยาบ้าจำนวน 40 คน (ร้อยละ 8.9) ซึ่งทหารกองประจำการดังกล่าวเคยอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร และชลบุรี จำนวน 10 คน (ร้อยละ 25) การใช้สารเสพติดชนิดฉีดพบว่าส่วนใหญ่ใช้ลดลง แต่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนร่วมเพศ 1 เดือน เพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ.2547 เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนร่วมเพศเท่ากับร้อยละ 3.5 ปี พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ด้านความรู้และความตระหนักพบว่ามีความรู้เพิ่มขึ้น ความรู้เรื่องการมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์และคนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคืออาจเป็นคนที่ไม่มีเชื้อเอดส์ได้พบว่ามีความรู้ลดลง

ข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตร สะท้อนสถานการณ์ ปัญหาพฤติกรรมในกลุ่มวัยรุ่นชายของจังหวัดพิจิตร แสดงให้เห็นว่าปัญหาการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นชายจังหวัดพิจิตรยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ และหญิงอื่น

Abstract

The purpose of the study about the behavior related to HIV infection of the male army conscripts in a regular unit of Phichit Province in turn of May, 2005 was in order to bring this data for planning to control and prevent. AIDS from those and teenagers in Phichit Province.

It was the study of epidemiology as description from the data of questionnaire of behavior watching out system related to HIV infection of Epidemiology Office, Disease Control Department, Ministry of Public Health. It was the second time of this performance in Phichit by using Epi. info version 6.04 Program to manage and analyse data by mean and percentage statistic.

Owing to the study it was found that the average age of young men who became soldiers in a regular unit of Phichit in 2004 – 2005 was higher about 3 years. The average age was 20.4 in 2004 and 23.1 in 2005. 36.3% of them graduated junior high school, 36.1% were employees and 77.0% were unmarried. They used to have sexual relation 72.7%

in 2004 and this increased to 78.0% in 2005. Most of the mates that they first had sexual relation were lovers and close friends 64.8%. Condoms were used fewer in their first sexual relation in 2004 – 2005 48.3% and 46.8%. The habit of using condoms every time in having sexual relation all year round of most of all groups decreased besides prostitutes. This group used the most condoms about 64.0%.

When they knew that they got venereal disease, they understood better how to do. It was found that they took drug addict less. Normally they smoked cigarettes in 2004 as well as 2005.

It was also found that 40 soldiers or 8.9% in a regular unit of Phichit used to take methamphetamine. Ten of them used to work in Bangkok and Chonburi Province. Injection was used less but drinking alcohol before having sexual relation increased 3.5% in 2004 and 5.4% in 2005. They were more careful a bit better. But their awareness of having only one mate that freed from HIV and the ones who looked healthy might get HIV decreased.

It showed that the tendency of a risk group who used to have experiences in sex was increasing in 2005 and the only youngest one was 8 years old. Most of the males that those first had sexual relation were lovers and close friends. Moreover condoms were used fewer with prostitutes.

So campaigns on AIDS prevention and control for all groups should be acted urgently and continuously. It should reach all groups that they can buy condoms conveniently eg. From automatic machines, condoms should be available in order to reach the target of 100%.

บทนำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 สำนักกระบวนวิชาได้ทำการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี โดยการติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีที่สำคัญๆ เช่น ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนครั้งแรก การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่าง ในกลุ่มประชากรที่เฝ้าระวังต่างๆ ทหารกองประจำการเป็นประชากรเฝ้าระวังที่สำคัญกลุ่มหนึ่ง พฤติกรรมในกลุ่มทหารกองประจำการเป็นภาพสะท้อนที่ดีของพฤติกรรมในวัยรุ่นชายทั่วไป และกลุ่มประชากรวัยรุ่นหนุ่มตอนต้น

จังหวัดพิจิตรได้เริ่มดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชาย – หญิง และ กลุ่มคนงาน ชาย – หญิง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ส่วนกลุ่มทหารกองประจำการไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง เนื่องจากไม่ใช่จังหวัดที่ตั้งของค่ายทหาร แต่จากผลการศึกษาความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทยทหารบก (HIV Sentinel Sero Surveillance) ในกลุ่มทหารเกณฑ์เฉพาะ จังหวัดพิจิตรพบว่า มีแนวโน้มขึ้นลงไม่คงที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 (ข้อมูลผลคัดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดพิจิตรเท่ากับร้อยละ 1.9) และในปี พ.ศ. 2546 พบว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร สูงเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย คือร้อยละ 1.6 ส่วนปี 2547 ความชุกการติดเชื้อเท่ากับร้อยละ 0.3 ในขณะที่ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มทหารกองประจำการของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2536 พบร้อยละ 3.6 ปี พ.ศ. 2541 ลดลงเหลือร้อยละ 1.9 และปีล่าสุด พ.ศ. 2547 ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 เพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง งานควบคุมโรคเอดส์จึงดำเนินการศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร
2. เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเอดส์ในกลุ่มทหารกองประจำการของจังหวัดพิจิตร

วัสดุและวิธีการ

การเก็บข้อมูลดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรฐานที่สำนักระบาดวิทยา ร่วมกับจังหวัดที่เข้าโครงการกำหนด และได้ผ่านการทดสอบภาคสนามแล้ว ประชากรเป็นทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตร ปี 2547 จำนวน 381 คน ปี 2548 จำนวน 453 คน ซึ่งตอบแบบสอบถามกลับมา มีทั้งครบและไม่ครบในประเด็นคำถาม และผู้ตอบไม่ต้องระบุชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จะใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งทีมวิจัยเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการเก็บข้อมูล รวมถึงให้คำแนะนำก่อนการตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงปล่อยให้ทหารกองประจำการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อตอบเสร็จให้นำแบบสอบถามคืนผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใส่ลงในกล่องที่เตรียมไว้ด้วยตนเอง

แบบสอบถามที่ตอบครบเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง และทำการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทีมงานวิจัยใช้โปรแกรม Epi Info, version 6.04 d ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป

ผลการศึกษา พบว่าชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตรผลัดที่ 1 มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ปี อายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพรับจ้างสูงสุด และส่วนใหญ่ยังเป็นโสด ส่วนใหญ่เคยอาศัยอยู่จังหวัดพิจิตรน้อยลง (ตาราง 1)

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จำแนกตามลักษณะทางประชากร จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2547 – 2548

| ลักษณะทางประชากร | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | จำนวน (n=381) | ร้อยละ | จำนวน (n=453) | ร้อยละ |
| กลุ่มอายุ (ปี) | | | | |
| 17 - 20 | 156 | 41.0 | 183 | 40.4 |
| 21 - 24 | 218 | 57.2 | 263 | 58.1 |
| 25 - 28 | 7 | 1.8 | 6 | 1.3 |
| 29 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
| เฉลี่ย | 20.4 | | 23.1 | |
| การศึกษา | | | | |
| ประถมศึกษา (ป. 1 - ป. 6) | 91 | 23.9 | 116 | 25.6 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3) | 135 | 35.4 | 164 | 36.2 |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) | 91 | 23.9 | 111 | 24.6 |
| อาชีวศึกษา และระดับอนุปริญญา | 48 | 12.6 | 49 | 10.8 |
| ปริญญาตรีขึ้นไป | 15 | 3.9 | 11 | 2.4 |
| ไม่ได้เรียน | 1 | 0.3 | 2 | 0.4 |

ตาราง 1 (ต่อ) จำนวนและร้อยละของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จำแนกตามลักษณะทางประชากร จังหวัด พิษณุตร พ.ศ.2547 – 2548

| ลักษณะทางประชากร | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|--|---------------|--------|---------------|--------|
| | จำนวน (n=381) | ร้อยละ | จำนวน (n=453) | ร้อยละ |
| อาชีพก่อนถูกเกณฑ์ทหาร | | | | |
| รับจ้างทั่วไป | 135 | 35.4 | 143 | 31.6 |
| เกษตรกรรม | 25 | 6.6 | 24 | 5.3 |
| นักเรียน นักศึกษา | 77 | 20.2 | 77 | 17.0 |
| ลูกจ้างโรงงาน บริษัท | 68 | 17.9 | 128 | 28.3 |
| ลูกจ้างร้านค้า | 12 | 3.1 | 15 | 3.3 |
| ค้าขาย | 18 | 4.7 | 17 | 3.8 |
| กรรมกร ผู้ใช้แรงงาน | 4 | 1.1 | 11 | 2.4 |
| ว่างงาน | 33 | 8.6 | 34 | 7.5 |
| อื่น ๆ (ช่างฝีมือ, อาชีพอิสระ, ราชการ) | 9 | 2.4 | 4 | 0.9 |
| สถานภาพสมรส | | | | |
| โสด | 296 | 77.6 | 349 | 77.0 |
| คู่ / เพื่อน / แฟน | 79 | 20.8 | 100 | 22.1 |
| หย่าร้าง | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 |
| แยกกันอยู่ | 4 | 1.1 | 3 | 0.7 |

2. ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และการมีเพศสัมพันธ์รอบปีที่ผ่านมา

ทหารกองประจำการมีเพศสัมพันธ์แล้วเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ปี 2547 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 72.7 ปี 2548 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเพิ่มเป็นร้อยละ 78.0 เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุ 8 ปี และส่วนใหญ่ร่วมเพศกับคนรัก หรือเพื่อนสนิท ร้อยละ 23.5 มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ ร้อยละ 4.3 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายร้อยละ 0.9 โดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์รอบปีที่ผ่านมา กับหญิงขายบริการทางเพศลดลง (ตาราง 2)

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของทหารกองประจำการ จำแนกตามประสบการณ์การร่วมเพศ จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2547 – 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ประสบการณ์การร่วมเพศ | (n=381) | | (n=450) | |
| เคย | 277 | 72.7 | 351 | 78.0 |
| ไม่เคย | 104 | 27.3 | 99 | 22.0 |
| อายุที่มีเพศสัมพันธ์ | (n=237) | | (n=292) | |
| 8 ปี | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 10 ปี | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 |
| 11 ปี | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 12 ปี | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 |
| 13 ปี | 2 | 0.8 | 8 | 2.7 |
| 14 ปี | 8 | 3.4 | 8 | 2.7 |
| 15 ปี | 39 | 16.5 | 43 | 14.7 |
| 16 ปี | 38 | 16.0 | 33 | 11.3 |
| 17 ปี | 40 | 16.9 | 63 | 21.6 |
| 18 ปี | 55 | 23.2 | 66 | 22.6 |
| 19 ปี | 25 | 10.5 | 30 | 10.3 |
| 20 ปี | 23 | 9.7 | 29 | 9.9 |
| 21 ปี | 5 | 2.1 | 6 | 2.1 |
| 22 ปี | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| เฉลี่ย | 17.1 | | 20.9 | |
| ประเภทคู่นอนที่ร่วมเพศครั้งแรก | (n=252) | | (n=324) | |
| คนรัก หรือเพื่อนสนิท | 147 | 58.3 | 210 | 64.8 |
| เมีย / คนที่อยู่กินด้วยกันในปัจจุบัน | 58 | 23.0 | 76 | 23.5 |
| หญิงอื่น | 32 | 12.7 | 21 | 6.5 |

ตาราง 2 (ต่อ) จำนวนและร้อยละของทหารกองประจำการ จำแนกตามประสบการณ์ร่วมเพศ จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2547 – 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| หญิงขายบริการทางเพศ | 15 | 6.0 | 14 | 4.3 |
| ผู้ชาย | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 |
| การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก | (n=263) | | (n=331) | |
| ใช่ | 127 | 48.3 | 155 | 46.8 |
| ไม่ใช่ | 136 | 51.7 | 176 | 53.2 |

3. ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการของจังหวัดพิจิตรรอบปีที่ผ่านมา มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพิ่มขึ้น ส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ในปี พ.ศ. 2548 มีสัดส่วนลดลงทุกกลุ่ม

ด้านการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์รอบปีที่ผ่านมาเมื่อมีคู่นอนเป็นหญิงขายบริการทางเพศ มีสัดส่วนสูงที่สุด ทั้ง 2 ปี และมีแนวโน้มลดลง และอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ล่าสุดกับหญิงขายบริการทางเพศลดลง (ตาราง 3)

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการจำแนกตามพฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ของจังหวัดพิจิตร 2547 – 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | จำนวน (n=381) | ร้อยละ | จำนวน (n=453) | ร้อยละ |
| มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ | 59 | 21.3 | 63 | 14.0 |
| ใช่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง | 43 | 72.9 | 48 | 64.0 |
| มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น | 130 | 46.9 | 175 | 39.8 |

ตาราง 3 (ต่อ) จำนวนและร้อยละของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการจำแนกตามพฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ของจังหวัดพิจิตร 2547 – 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|--|---------------|--------|---------------|--------|
| | จำนวน (n=381) | ร้อยละ | จำนวน (n=453) | ร้อยละ |
| ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง | 52 | 40.0 | 79 | 43.9 |
| มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย | 7 | 2.5 | 12 | 2.7 |
| ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง | 4 | 57.1 | 8 | 47.0 |
| ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับหญิงขายบริการทางเพศ | 45 | 76.3 | 69 | 75.8 |
| ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ ครั้งล่าสุดกับหญิงอื่น | 74 | 56.9 | 118 | 60.5 |

4. ประวัติการป่วยเป็นกามโรค

สัดส่วนของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการที่เคยป่วย หรือสงสัยว่าป่วยเป็นกามโรคเพิ่มขึ้น ในขณะที่การปฏิบัติตน ไปพบแพทย์ที่คลินิก ศูนย์กามโรค หรือ โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาลดลง พบว่าส่วนใหญ่ไปซื้อยากินเอง โดยไม่ได้พบแพทย์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50.0 ในปี พ.ศ.2548 (ตาราง 4)

ตาราง 4 จำนวนและร้อยละของการป่วยเป็นกามโรค และการปฏิบัติตน ในรอบปีที่ผ่านมาของชายไทยที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2547 - 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การเคยเป็นกามโรค | (n = 271) | | (n = 257) | |
| เคยเป็นหรือสงสัยว่าเป็นกามโรค | 52 | 19.2 | 50 | 19.5 |
| ไม่เคยเป็นหรือสงสัยว่าเป็นกามโรค | 219 | 80.80 | 207 | 80.5 |
| การปฏิบัติตนถ้าป่วยกามโรค | (n = 52) | | (n = 50) | |
| ซื้อยากินเองโดยไม่ได้พบแพทย์ | 12 | 23.1 | 25 | 50.0 |
| ไปพบแพทย์ที่คลินิก ศูนย์กามโรค หรือ โรงพยาบาล | 8 | 15.4 | 12 | 24.0 |
| ไม่ได้รักษา | 32 | 61.5 | 13 | 26.0 |

5. ประวัติการใช้สารเสพติด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าทหารกองประจำการของจังหวัดพิจิตร ใช้สารเสพติดลดลง สารเสพติดที่เคยใช้ส่วนใหญ่ คือ บุหรี่ เหมือนกันทั้ง 2 ปี (ตาราง 5)

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของการใช้สารเสพติดของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2547 – 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การเคยลองใช้ หรือการใช้สารเสพติด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | (n = 376) | | (n = 444) | |
| เคย | 298 | 79.3 | 346 | 77.9 |
| ประสบการณ์ การใช้สารเสพติด | (n = 295) | | (n = 444) | |
| บุหรี่ | 261 | 88.5 | 326 | 73.4 |
| ยาบ้า | 26 | 8.8 | 124 | 27.9 |
| กาว ทินเนอร์ | 1 | 0.3 | 42 | 9.5 |
| เฮโรอีน | 1 | 0.3 | 11 | 2.5 |
| กัญชา | 1 | 0.3 | 96 | 21.6 |
| ฝิ่น | 0 | 0.0 | 7 | 1.6 |
| ยาเค | 0 | 0.0 | 6 | 1.4 |
| ยาอี | 2 | 0.7 | 12 | 2.7 |
| กระท่อม | 0 | 0.0 | 60 | 13.5 |
| อื่น ๆ (เหล้า) | 3 | 1.0 | 16 | 3.6 |
| ประสบการณ์การใช้สารเสพติดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | (n = 267) | | (n = 437) | |
| บุหรี่ | 242 | 90.6 | 295 | 67.5 |
| ยาบ้า | 13 | 4.9 | 40 | 9.2 |
| กาว ทินเนอร์ | 5 | 1.9 | 8 | 1.8 |
| เฮโรอีน | 2 | 0.7 | 5 | 1.2 |
| กัญชา | 4 | 1.5 | 36 | 8.2 |
| ฝิ่น | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 |

ตาราง 5 (ต่อ) จำนวนและร้อยละของการใช้สารเสพติดของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2547 – 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|----------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ยาเค | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 |
| ยาอี | 0 | 0.0 | 7 | 1.6 |
| กระท่อม | 0 | 0.0 | 20 | 4.6 |
| อื่น ๆ (เหล้า) | 1 | 0.4 | 18 | 4.1 |

6. ประวัติการใช้สารเสพติดชนิดผิด

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดชนิดผิด พบว่าชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการของจังหวัดพิจิตรเคยใช้สารเสพติดชนิดผิดลดลง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นรอบปีที่ผ่านมา การใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศ 1 เดือนที่ผ่านมา และการเคี้ยวเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในปี พ.ศ. 2548 พบว่าลดลง (ตาราง 6)

ตาราง 6 จำนวนและร้อยละของประสบการณ์การใช้สารเสพติดชนิดผิด ของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2547 – 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การใช้สารเสพติดชนิดผิดในรอบปีที่ผ่านมา | (n = 296) | | (n = 447) | |
| เคย | 12 | 4.1 | 6 | 1.3 |
| ไม่เคย | 284 | 95.9 | 441 | 98.7 |
| การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นรอบปีที่ผ่านมา | (n = 296) | | (n = 447) | |
| เคย | 7 | 2.4 | 5 | 1.1 |
| ไม่เคย | 289 | 97.6 | 442 | 98.9 |
| การใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศ 1 เดือนที่ผ่านมา | (n = 267) | | (n = 446) | |
| เคย (ใช้ทุกครั้ง) | 5 | 1.9 | 6 | 1.3 |
| ไม่เคย | 262 | 98.10 | 440 | 98.70 |

ตาราง 6 (ต่อ) จำนวนและร้อยละของประสบการณ์การใช้สารเสพติดชนิดฉีด ของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2547 – 2548

| พฤติกรรมที่เฝ้าระวัง | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | (n = 371) | | (n = 434) | |
| เคย | 341 | 91.9 | 394 | 90.8 |
| ไม่เคย | 30 | 8.10 | 40 | 9.20 |
| การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนร่วมเพศ 1 เดือนที่ผ่านมา | (n = 340) | | (n = 444) | |
| เคย (ดื่มทุกครั้ง) | 12 | 3.5 | 24 | 5.4 |
| ไม่เคย | 328 | 96.50 | 420 | 94.60 |

7. ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้ของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตรพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (ตาราง 7)

ตาราง 7 จำนวนและร้อยละความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์ของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2547 – 2548

| ความรู้และความตระหนัก เกี่ยวกับเรื่อง โรคเอดส์ | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การใช้ถุงยางอนามัย สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ | (n = 371) | | (n = 443) | |
| ใช่ (ตอบถูก) | 345 | 93.0 | 421 | 95.0 |
| ไม่ใช่ (ตอบผิด) | 26 | 7.0 | 22 | 5.0 |
| การมีคู่นอนคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์เป็นวิธีหนึ่งป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ | (n = 367) | | (n = 442) | |
| ใช่ (ตอบถูก) | 309 | 84.2 | 362 | 81.9 |
| ไม่ใช่ (ตอบผิด) | 58 | 15.8 | 80 | 18.1 |
| ยุ่งสามารถ เป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คนได้ | (n = 369) | | (n = 440) | |
| ใช่ (ตอบผิด) | 252 | 68.3 | 160 | 36.4 |
| ไม่ใช่ (ตอบถูก) | 117 | 31.7 | 280 | 63.6 |

ตาราง 7 (ต่อ) จำนวนและร้อยละความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์ของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2547 – 2548

| ความรู้และความตระหนัก เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ | พ.ศ. 2547 | | พ.ศ. 2548 | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์ได้ | (n = 370) | | (n = 439) | |
| ใช่ (ตอบผิด) | 286 | 77.3 | 116 | 26.4 |
| ไม่ใช่ (ตอบถูก) | 84 | 22.7 | 323 | 73.6 |
| คนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคืออาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอดส์ | (n = 367) | | (n = 440) | |
| ใช่ (ตอบถูก) | 263 | 71.7 | 299 | 68.0 |
| ไม่ใช่ (ตอบผิด) | 104 | 28.3 | 141 | 32.0 |
| ในปัจจุบันมียาที่สามารถ ยับยั้งเชื้อเอดส์ได้ (ยาต้านไวรัส) ได้ใช่หรือไม่ | (n = 369) | | (n = 442) | |
| ใช่ (ตอบถูก) | 153 | 41.5 | 236 | 53.4 |
| ไม่ใช่ (ตอบผิด) | 216 | 58.5 | 206 | 46.6 |
| ท่านเคยตรวจเลือดโดยสมัครใจหรือไม่ | (n = 365) | | (n = 437) | |
| เคยไปตรวจโดยสมัครใจ | 107 | 29.3 | 111 | 25.4 |
| เคยตรวจเพราะเกณฑ์ทหาร | 17 | 4.7 | 18 | 4.1 |
| อื่นๆ (ตรวจสุขภาพประจำปี, บริจาคเลือด, สมัครงาน) | 20 | 5.5 | 4 | 0.9 |
| ไม่เคยตรวจ | 221 | 60.5 | 304 | 69.6 |

อภิปรายผล

การศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตรผลัดเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ.2547-2548 เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่าชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ จังหวัด

พิจิตร อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่อายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลง มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น พบว่าระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีลดลง อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างเหมือนกันทั้งสองปี สถานภาพส่วนใหญ่ยังโสด ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นคนรัก หรือเพื่อนสนิทเหมือนกันทั้ง 2 ปี และพบว่ารอบปีที่ผ่านมามีชายไทยที่เข้าเป็นทหารกอง

ประจำการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับหญิงขายบริการทางเพศมากกว่าหญิงอื่น

กลุ่มชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการของจังหวัดพิจิตรเป็นกลุ่มประชากรวัยรุ่น ส่วนใหญ่ยังเป็นโสด แต่กลับพบว่ามีการมีเพศสัมพันธ์ทางเพศแล้วค่อนข้างสูง อายุต่ำสุดในการมีเพศสัมพันธ์ลดลง อาจเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านร่างกายที่ดีของเด็กในปัจจุบัน ทำให้เข้าสู่วัยรุ่นโดยเร็ว รวมทั้งสภาพสังคมที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีอิสระในการใช้ชีวิต รวมถึงการสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ทำให้วัยรุ่นมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย และข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งมีหญิงบริการเป็นผู้ที่มีโอกาสรับเชื้อและมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังกลุ่มอื่นได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเสมอภาคของเพศชายและเพศหญิง โดยคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสทำให้มีโอกาสได้ศึกษานิสัยใจคอกัน ได้มีประสบการณ์ทางเพศและเป็นการแสวงหาความสุขร่วมกัน จึงอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการของจังหวัดพิจิตร นิยมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนรักมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ขณะที่อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ในระดับต่ำ ทั้ง 2 ปี นั้น อาจเนื่องมาจากความคิดที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก หรือเพื่อนสนิท ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ

หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการเตรียมการ และในสถานที่นั้นก็ไม่สามารถหาถุงยางอนามัยมาใช้ได้อย่างสะดวก จึงทำให้อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับกรณีใช้อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมามีผลลดลงเกือบทุกประเภทของกลุ่มคน แต่ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อมีคู่นอนเป็นหญิงขายบริการทางเพศ อาจเป็นเพราะว่าการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ช่วงหนึ่งมีการแพร่ระบาดของหญิงขายบริการทางเพศไปยังกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะชายนักเที่ยว ประชาชนจึงให้ความสำคัญในการป้องกันโรคเอดส์กับกลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ดี อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศของชายไทยที่เข้าเป็นทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตรในปี พ.ศ. 2547 – 2548 กลับลดลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการถุงยางอนามัย 100% จึงควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการรณรงค์ในการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนเมื่อป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเป็นกามโรค พบว่าส่วนใหญ่เคยป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเป็นกามโรคเพิ่มขึ้น และการปฏิบัติที่ถูกต้อก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น การไปพบแพทย์ที่คลินิก ศูนย์กามโรคหรือโรงพยาบาล แสดงให้เห็นว่ามีการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น แต่พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงคือ การซื้อยากินเองโดยไม่ไปพบแพทย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.1

เป็นร้อยละ 50.0 ซึ่งเห็นว่าคลินิกกามโรคของจังหวัด พิษณุ ยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด พบว่าเคยใช้ ลดลง สารเสพติดที่ใช้ส่วนใหญ่คือบุหรี่เหมือนกันทั้ง 2 ปี สารเสพติดที่เคยใช้ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ การใช้เพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนคือ ยาบ้า ปี พ.ศ.2547 พบ จำนวน 13 คน ปี พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 40 คน จากการ วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าชายไทยที่เข้าเป็นทหารกอง ประจำการดังกล่าวเคยอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร และ ชลบุรี นานที่สุดรอบปีที่ผ่านมาจำนวน 10 คน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวี ประเทศไทย ปี พ.ศ.2547 ของ ธนรัักษ์ ผลิพัฒน์ ที่พบว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในระดับประเทศเท่ากับ ร้อยละ 42.2 ซึ่งนับว่าเป็นระดับที่ยังคงสูงมาก และความชุกยังไม่มีความโน้มถ่วงลดลง จากการสำรวจพบว่า มีจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาใน สถานพยาบาลของรัฐซึ่งเป็นหน่วยเฝ้าระวังลดลงอย่างมาก มี 4 จังหวัดที่สามารถทำการสำรวจการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดได้มากกว่า 20 คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ความชุก 38.0), ชลบุรี (ความชุก 55.9), สงขลา (ความชุก 41.4) และนราธิวาส (ความชุก 43.1)

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนร่วมเพศ 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่าประสพการณ์การดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนร่วมเพศเพิ่มขึ้น ซึ่งนับว่า พฤติกรรมการใช้สารเสพติดดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เพราะยาเสพติดทุกชนิด

เช่น บุหรี่ เหล้า แอลกอฮอล์ ยานอนหลับ คาเฟอีน แอมเฟตามีน ฯลฯ เมื่อเข้าสู่กระแสโลหิตจะไป กระตุ้นศูนย์แห่งความพึงพอใจทำให้มีความสุข แต่ไป รบกวนศูนย์แห่งการตัดสินใจ ทำให้เกิดการตัดสินใจ ผิดพลาด ซึ่งจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ ผิดพลาดได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และฝึกทักษะชีวิตในการป้องกันโรคเอดส์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
2. ควรทบทวนการดำเนินงานโครงการ งดขายนามัย 100% โดยเน้นให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม ต่างๆ ให้มากที่สุด และงดขายนามัยควรที่จะหาได้ อย่างสะดวกตามสถานที่ๆเหมาะสม
3. ในกลุ่มผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว โดยเฉพาะ ในกลุ่มทหารกองประจำการที่สมรสแล้ว ควร สนับสนุนค่านิยมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แบบรักเดียว ใจเดียว หรือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของตนเท่านั้น
4. ควรมีการรณรงค์เรื่องการใส่ถุงยาง ออนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่คู่นอน ประจำ

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทย์ประจักษ์ วัฒนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุ

นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีตีสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, นางพรรณิ ปานบุญ หัวหน้างานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ให้ความกรุณาสับสนุนทรัพยากร ตลอดจนให้คำแนะนำทุกด้านและขอขอบคุณสัสดีจังหวัดพิจิตร สัสดีอำเภอทุกอำเภอที่อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้คือ ทหารกองประจำการจังหวัดพิจิตร ผลัดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547 - 2548 ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือและตอบแบบสอบถามจนทำให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ประไพศรี แก้ววิเชียร ที่ช่วยกรุณาแปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้งานวิจัยชิ้นนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. ขนิษฐา กาญจนะไพโรจน์, สุมาลี แซ่หลี. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทย. สำนักกระบวนวิชา, 2546.
2. งานระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัฒนโรด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานงานระบาดวิทยา แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทหารกองประจำการ. สำนักกระบวนวิชา, 2547.

3. ชัยยศ คุณานุสนธิ์. เอดส์ : ปัญหาผลกระทบ และการตอบสนองของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจเอสการพิมพ์, 2543.

4. ธนรัภย์ ผลิพัฒน์. ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2547. วารสารโรคเอดส์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2548.

5. สุทธนันท์ สุทธชนะ และคณะ. พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจำการ รอบที่ 9 ปี พ.ศ. 2546. วารสารโรคเอดส์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2547.